

**Informacja dla pacjenta poddającego się operacji w Oddziale Chirurgii 1-go Dnia  
w Klinice Wiśniowa**

**Informacje ogólne**

- 1- W celu ustalenia terminu zabiegu proszę dzwonić pod numer 602 130 069 lub osobiście skontaktować się z Oddziałową Oddziału w Klinice Wiśniowa
- 2- Na 7-10 dni przed terminem zabiegu wykonać badania: morfologia, jonogram (Na, K), kreatynina, ukł. krzepnięcia (PT, APTT, INR) oraz ekg serca (można w POZ)
- 3- W dniu zabiegu pozostać na czczo lub jeśli zabieg wykonywany jest po godz. 15.00 można rano wypić klarowny napój (do godz. 09.00)
- 4- Przyjść na zabieg co najmniej ½ godz. wcześniej z badaniami i ekg (przed zabiegiem trzeba wypełnić i podpisać wymagane dokumenty oraz zgodę na zabieg)
- 5- Na drugi dzień po zabiegu około godz. 7-8 rano można opuścić Oddział w towarzystwie osoby drugiej (trzeba zapewnić sobie transport do domu, samemu nie można prowadzić)
- 6- Konieczność wystawienia zwolnienia lekarskiego zgłosić przed operacją

**UWAGA: nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do operacji w trybie jednodniowym – kwalifikację przeprowadza chirurg i anestezjolog. Ostateczna kwalifikacja dokonywana jest tuż przed operacją po dostarczeniu wymaganych badań obrazowych i laboratoryjnych.**

**Informacje dodatkowe dla pacjentów poddających się operacji przepukliny pachwinowej**

1. Nie golić pachwin !!! (strzyżenie odbędzie się tuż przed operacją)
2. Jeśli zabieg będzie wykonywany w godzinach popołudniowych można opuścić Oddział w godzinach wieczornych w towarzystwie osoby drugiej (trzeba zapewnić sobie transport do domu, samemu nie można prowadzić)

**Informacje dodatkowe dla pacjentów poddających się operacji liserowej plastyki hemoroidów**

1. Na 2-3 godz. przed ustaloną godziną zabiegu zaaplikować sobie 2 czopki glicerynowe doodbytniczo w celu wypróżnienia (czopki dostępne są bez recepty)
2. Około 2-4 godz. po zabiegu można opuścić Oddział w towarzystwie osoby drugiej (trzeba zapewnić sobie transport do domu, samemu nie można prowadzić)

**Informacje dodatkowe dla pacjentów poddających się operacji przepukliny brzusznej lub pępkowej z plastyką rozstępu mięśni prostych brzucha**

1. zaleca się zakupić i przynieść pas brzuszny przeciw przepuklinowy (odpowiedni rozmiar do kupienia w sklepie medycznym)